Les Lampyrides typiques du Muséum,

par M. Ernest Olivier.

TYPES DE SOLIER.

Solier fut chargé de la partie entomologique de *Historia fisica y politica de Chile*, publiée par Claudius Gay.

Le volume qui contient les descriptions de Lampyrides porte la date de 1849.

Solier y décrit 11 espèces réparties en 3 genres.

Ces insectes sont conservés au Muséum. J'ai pu les examiner, grâce à la bienveillance de M. le professeur Bouvier, et c'est le résultat de cette étude que je viens faire connaître.

Les trois genres sont *Rhipidophorus* (1 espèce), *Cladodes* (1 espèce) et *Pyractonema* (9 espèces).

Les deux premiers sont identiques et font absolument double emploi. Je propose de conserver *Cladodes* qui a été adopté par les auteurs.

Le genre *Pyractonema*, qui figure déjà dans le Catalogue Dejean et dans lequel Solier a fait entrer des insectes voisins des *Lucidota* mais d'un facies tout particulier, doit être maintenu [1].

Mais parmi les 9 espèces qui le composent, il y a lieu d'en réunir 4. L'examen attentif des types m'a, en effet, amené à conclure que *rhododerum* et *binotatum* sont des individus femelles identiques et que *lugubre* est un individu mâle de la même espèce. La description, du reste, signale bien la forme différente du dernier segment de l'abdomen, caractère sur lequel Solier base son espèce, tandis qu'il est simplement sexuel.

Quant à *fissicolle*, c'est un exemplaire qui présente la curieuse anomalie d'une assez profonde incision au sommet du prothorax.

Le nom de *rhododerum*, venant le premier dans l'ordre des descriptions, doit être adopté.

[1] Dejean avait écrit *Pyractomena*. D'autre part, Leconte (*Proc. Acad. Nat. sc. Philadelphia*, 1851, p. 335) caractérise ce genre *Pyractomena* dans lequel il fait entrer un groupe de *Photinus* de l'Amérique du Nord. Motschulsky (*Et. ent.*, 1852, p. 37) écrit *Pyrectomena*, tout en citant Dejean. Le vocable *Pyractonema* Sol. a la priorité, puisqu'il date de 1849. Il comprend des insectes tout différents de ceux que Leconte et Motschulsky mettaient dans leurs genres *Pyractomena* et *Pyrectomena* et, au point de vue orthographique, il ressemble trop à ces derniers pour qu'ils puissent être conservés. Je propose de remplacer la dénomination de Leconte par celle de *Lecontea*. Ainsi *Lecontea* Ern. Oliv. = *Pyractomena* Lec. = *Pyrectomena* Motsch. nec *Pyrectomena* Sol.

Les types de Solier doivent donc être classés ainsi :

Rhipidophorus ater Sol.	= Cladodes ater Sol.
Cladodes flabellatus Sol	Recte.
Pyractonema compressicorne Sol	Recte.
— albomarginatum Sol.	Recte.
— vicinum Sol.	Recte.
— nigripenne Sol.	Recte.
— rhododerum ♀ Sol.	= Pyractonema rhododerum Sol.
— lugubre ♂ Sol.	= Pyractonema rhododerum Sol.
— binotatum ♀ Sol.	= Pyractonema rhododerum Sol.
— fissicolle Sol. anomalie . .	= Pyractonema rhododerum Sol.
— brevipenne, Sol.	Recte.

Descriptions de Braconides,

par le Révérend T.-A. Marshall.

(Laboratoire de M. Bouvier.)

1. Coeloïdes (section Atanycolus) tunetensis n. sp.

Mêmes caractères que ceux de *C. Neesii*, excepté ce qui suit.

♀ Sillons du mésothorax peu profonds. Scutellum d'un jaunâtre sale vers l'extrémité, cette couleur s'avançant un peu sur les côtés du mésothorax : une ligne transversale sur le frenum, et une autre longitudinale sur le métathorax, jaunâtres. Troisième segment de l'abdomen plus évidemment sculpté, montrant deux carènes rapprochées et élevées postérieurement : son bord postérieur fortement concave ou excavé. Tarière à peine aussi longue que le corps. Longueur, 8 millimètres.

♂ Semblable, avec les deux derniers segments de l'abdomen noirs. M. Seurat m'a envoyé deux exemplaires du ♂, dont l'un a la même taille que la ♀, l'autre n'a qu'une longueur de 6 millimètres. Le plus grand des mâles a un peu de couleur pâle sur le scutellum, laquelle manque à l'autre exemplaire. La coque, en forme de cercueil, ne diffère point de celles déjà décrites.

Patrie. — Aïn Draham, Tunisie.

2. Doryctes liogaster n. sp.

♀ Abdomen d'un testacé orangé; tout le reste noir et brillant. Cette espèce, qui présente d'une manière typique tous les traits du genre *Doryctes*, ne peut être confondue qu'avec *Doryctes leucogaster* Nees (Hymén. d'Europe et d'Algérie, I., p. 233). Elle en est distincte par la sculpture de